

ICE

Les effets varient d'un consommateur à l'autre. On sait que l'état physique et psychique de l'utilisateur, la composition du produit, la quantité utilisée, le mode de consommation, le mélange à d'autres produits et le contexte de consommation influent grandement sur les effets ressentis.

- Effets immédiats :

Immédiatement après avoir consommé de l'ice, l'utilisateur ressent un flash suivi d'une sensation d'euphorie qui ne dure que quelques minutes.

Comme tous les stimulants, la métamphétamine accélère le fonctionnement du corps et du cerveau. La drogue supprime aussi bien la sensation de faim que de fatigue. Elle apporte au consommateur une impression de grande confiance en soi et lui donne l'illusion d'être invincible, de posséder des capacités physiques et intellectuelles accrues. Ses effets s'accompagnent d'une nervosité importante pouvant conduire l'utilisateur à des comportements d'agressivité verbale ou/et physique.

En fonction de la quantité de produit absorbée et du mode d'administration utilisé, les effets peuvent durer de 4 à 12 heures voire plus. La durée est supérieure à celle obtenue avec les autres amphétamines et s'avèrent être bien plus toxiques pour le cerveau.

- Risques immédiats :

La perte des sensations de faim, de soif et de fatigue conduit l'utilisateur à dépasser les limites de ses résistances physiques. Les malaises hypoglycémiques, les troubles de l'équilibre et la déshydratation sont de sérieux risques pouvant entraîner la mort du consommateur.

La nervosité peut devenir incontrôlable et amener l'utilisateur à des comportements d'agressivité envers son entourage mais également envers lui-même.

La sous-estimation du danger amène la personne sous ice à prendre de gros risques (conduite dangereuse, oubli de se protéger...).

Ce sont les hallucinations visuelles, auditives ou sensorielles qui surviennent de façon soudaine entraînant des comportements incongrus voire pathologiques qui se révèlent être difficiles à contrôler. Elles sont vécues comme angoissantes et perturbent la vie du consommateur et de ses proches.

Quand les effets disparaissent, à la descente, la dépression et le découragement surviennent rapidement. Tout effort de raisonnement devient pénible.

Le risque de passage à l'acte suicidaire est important et ne doit surtout pas être sous-estimé. Les épisodes de paranoïa peuvent conduire à des pensées suicidaires ou meurtrières. Ils ne dépendent aucunement de la quantité de produit utilisée et sont susceptibles de survenir même lors de la toute première prise d'ice. En outre, ces symptômes psychiatriques peuvent persister pendant des mois après le sevrage.

SOURCE <https://www.drogue-polynesie.com/>